

2.5.3 Réalisation des interventions

Le tableau ci-dessous présente la séquence des activités de postvention qui pourraient avoir lieu à la suite d'un suicide.

Tableau 4
Exemple de la séquence de la réalisation des interventions de postvention

Interventions \ Temps	1 ^{ère} sem.	2 ^e sem.	3 ^e -4 ^e sem.	5 ^e -6 ^e sem.	7 ^e -8 ^e sem.	9 ^e -10 ^e sem.	11 ^e -12 ^e sem.	4 ^e mois	5 ^e mois	6 ^e mois et plus
Annnonce de la nouvelle										
Recadrage de l'information										
Ventilation										
Débriefing (Pour les témoins directs seulement)										
Intervention reliée au trouble de stress post-traumatique										
Repérage des jeunes vulnérables										
Intervention de crise ou de crise suicidaire										
Intervention précoce de deuil										
Counseling de deuil										
Thérapie de deuil										

N.B. : Le choix d'application de ces différentes interventions de postvention est en fonction de l'analyse de la situation et des besoins des sous-groupes.

2.5.4 Bilan des interventions réalisées

Il importe de faire régulièrement le point sur les interventions en cours et celles qui se terminent et ce, tant pour les interventions qui se déroulent sur une brève période que pour celles qui se tiennent sur plusieurs semaines ou quelques mois. Il faut vérifier si les interventions déployées sont toujours appropriées et si celles qui ont été menées à terme ont eu les effets escomptés auprès des jeunes ciblés. Ce bilan implique qu'une analyse de la situation doit être effectuée de façon récurrente sur une période dépassant largement la première semaine suivant le suicide. Cette nouvelle analyse de la situation est le prélude aux autres étapes de gestion clinique qui comportent le choix de nouvelles interventions, si nécessaire, la réalisation d'autres interventions de postvention et un nouveau bilan des interventions réalisées. Ainsi, dans l'éventualité où d'autres besoins se font ressentir, d'autres interventions doivent être mises en place dépendamment de cette nouvelle analyse de la situation. Par exemple, le groupe de jeunes ciblés pourrait s'agrandir et le type d'activités de postvention s'adapter à leurs nouveaux besoins.